

ROYATA KWS



Teeltadvies Pootgoedteelt Fresh



- Vroeg met een vroege knolzetting
- Goede opbrengst
- Grove knollen
- Goed onderwater gewicht (OWG)



Morfologie

Rijptijd	70	Midden vroeg
Grofheid	82	Grof
Knolaantal	12-14	
Vleeskleur na koken	Licht geel	
Schilkleur	Rood	
Bloemkleur	3	Paars

Toleranties

Kiemrust	38	Kort
Sencor gevoeligheid	60	Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	80	Zeer goed
Blauwgevoeligheid	19	Gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof	17,1	
OWG	307	

Resistenties

Kringerigheid	99	Hoog resistent
Phytophthora loof	54	Vatbaar
Poederschurft	80	Hoog resistent
YN-virus	47	Zeer vatbaar
YNTN-virus zichtbaarheid	70	Zichtbaar

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	9		
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
8			

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 250 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

ROYATA KWS



Teeltadvies Pootgoedteelt Fresh

Voorbehandeling en poten

- ROYATA KWS heeft een normale kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	50.000	27	22
-35/55	42.000	32	26

-Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.



Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Vrij gevoelig voor Metribuzin (Sencor), kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria Solani en Alternaria Alternata.

Loofdoding en oogst

- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- ROYATA KWS is gemiddeld gevoelig voor mechanische beschadiging. Beperk de valhoogtes.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een behandeling tegen bewaarziekten met Imazalil wordt geadviseerd
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.