


EL MUNDO



Consejos generales para la producción de consumo



- Alto rendimiento
- Número muy alto de tubérculos
- Baja necesidad de nitrógeno
- Planta fuerte



Morfología

Tipo de cocion	AB - Ligeramente firme
Maduración	59 Semi- tardía
Producción	135 Muy alta
Tamaño del tuberculo	87 Muy grandes
Forma	Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos	12-14
Color carne cocinar	Amarilla
Color de piel	Amarilla

Tolerancias

Período de dormencia	50 Algo corto
Emergencia	76 Rápida
Sens. Metribuzin	55 Bastante sensible
Desarrollo de la planta	77 Bueno
Golpeo interno	5 No sensible
Fenómeno patatitas	90 No sensible
Materia seca	18,2
Onderwatergewicht	329

Resistencias

Spraing	Resistente
Mildiú en planta	Poco sensible
Mildiú en el tubérculo	Poco sensible
Sarna común	Poco sensible
Sarna verrugosa	Resistente
Virus Yn	Muy sensible
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	5	6	6
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

Fertilización

- Nitrógeno (N): aproximadamente 80% en comparación con otras variedades medio-tardías.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- No aplicar Cloruro Potásico (KCl) a menos de 6 semanas de la plantación, ya que las aplicaciones tardías pueden inducir a una materia seca más baja.

Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- La dominancia apical es muy fuerte.
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Plantaciones demasiado tempranas aumentan el riesgo de malformaciones debido a Rhizoctonia
- Se aconsejan tratamientos en el tubérculo y/o en el suelo para el control de Rhizoctonia, Sarna plateada y otras enfermedades de la piel provenientes del suelo. Azoxystrobin, como producto aplicado al terreno, produce buenos resultados contra muchos hongos.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	75.000	18	15
-35/45	42.000	32	26
-35/50	42.000	32	26
-35/55	36.000	37	31
-45/55	38.000	35	29
-Profundidad de plantación: Normal.			



Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- EL MUNDO es susceptible a Metribuzin, también cuando se aplica en pre-emergencia
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata
- A pesar de su buena resistencia contra Phytophthora, se aconsejan aplicaciones preventivas en ciclos de cultivo largos.
- La variedad es un poco sensible a la sarna común.
- Asegurar un crecimiento regular y evitar el stress (calor) ya que puede dar lugar a deficiencias en la carne.

Destrucción de las plantas

- EL MUNDO tiene una buena separación del estolón.
- Asegurar mínimo 3 semanas desde el quemado y la cosecha para tener una mejor fijación de la piel

Almacenamiento

- Prevenir la deshidratación
- Temperaturas estables durante el almacenamiento previene del desarrollo de Sarna plateada.