


EL MUNDO



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



- Goede opbrengst
- Zeer hoog knolaantal
- Lage stikstofbehoefte
- Sterk loof



Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	59 Midden laat
Opbrengst rijp	135 Zeer hoog
Grofheid	87 Zeer grof
Knolvorm	Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Geel
Schilkleur	Geel

Toleranties

Kiemrust	50 Vrij kort
Opkomst	76 Vlot
Sencor gevoeligheid	55 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	77 Goed
Blauwgevoeligheid	5 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	18,2
OWG	329

Resistenties

Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Resistent
YN-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

Aardappelmoeheid			
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	5	6	6
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

Bemesting

- N-gift: 80% in vergelijking tot andere middenlate rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Chloorkali (KCl) niet korter dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.

EL MUNDO



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- Vrij sterke topspruit dominantie.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Te vroeg planten kan een hoger risico op misvormde knollen door Rhizoctonia tot gevolg hebben.
- Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschorft en andere bodemgebonden ziekten te beheersen. Azoxystrobine toegediend op de bodem zorgt voor goede resultaten op vele schimmels.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	75.000	18	15
-35/45	42.000	32	26
-35/50	42.000	32	26
-35/55	36.000	37	31
-45/55	38.000	35	29

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.



Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- EL MUNDO is gevoelig voor Metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria Solani en Alternaria Alternata.
- Ondanks de goede resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst, vanwege het lange groeiseizoen.
- EL MUNDO is gevoelig voor gewone schurft.
- Vanwege het risico op Calciumgebrek, zorg voor een regelmatige groei en vermijd hittestress.

Loofdoding en oogst

- Knollen laten makkelijk los van het loof.
- Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid.

Bewaring

- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en product temperatuur.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschorft.