


SH C 1001



Consejos generales para la producción de consumo



- Variedad muy fuerte
- Materia seca alta
- Tamaño y forma uniforme del tubérculo
- Alta resistencia a virus Yn
- Buen almacenamiento



Morfología

Maduración	60	Semi- tardia
Producción	105	Alta
Tamaño del tuberculo	80	Calibre grande
Forma		Redonda / Redonda-oval
Número de tubérculos	15-17	
Color carne cocinar		Amarilla
Color de piel		Amarilla oscuro

Tolerancias

Período de dormencia	67	Medio
Sens. Metribuzin	60	Bastante sensible
Desarrollo de la planta	76	Bueno
Golpeo interno	24	Muy sensible
Fenómeno patatitas	90	No sensible
Materia seca	24,2	
Onderwatergewicht	451	

Resistencias

Spraing	99	Buena resistencia
Mildiú en planta	56	Poco sensible
Sarna común	55	Sensible
Virus Yn	99	Buena resistencia
Tol. Yntn tubérculo	99	Tolerante

Res. a nemátodos			
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8		1	
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 230 kg. N/Ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.
-
- Manganeso y Magnesio proporcionan una vegetación fuerte y previenen de una senescencia prematura
- Prestar atención en mantener la planta vigorosa

SH C 1001



Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- SH C 1001 tiene una dormencia larga
- Tratar siempre la semilla de SH C 1001 y el suelo contra Rhizoctonia
- SH C 1001 puede ser cultivada en todo tipo de suelos
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- Plantar SH C 1001 3 cm más profundo para obtener un sistema radicular más fuerte y una mejor absorción de los nutrientes
- Plantando con yemas blanquecinas, se obtienen los mejores resultados.

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-30/40	54.000	25	21
-40/50	42000	32	26
-50/60	32.000	42	35

-Profundidad de plantación: Normal.
-Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.



Período de cultivo

- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.
- SH C 1001 no es sensible a Spraing.

Destrucción de las plantas

- Cosechar SH C 1001 con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento