


## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Hoog knolaantal
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst
- Goede droogteresistentie



### Morfologie

Kooktype	BC - Kruidig
Rijptijd	62 Midden laat
Opbrengst rijp	114 Hoog
Grofheid	80 Grof
Knolvorm	Lang-ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel

### Toleranties

Kiemrust	64 Gemiddeld
Opkomst	74 Normaal
Sencor gevoeligheid	85 Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	76 Goed
Blauwgevoeligheid	17 Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	21,1
OWG	389

### Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Vatbaar
YN-virus	Vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

### Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8	+3		
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

+ Geen officiële meting /  
Stet eigen meting

### Bemesting

- Stikstof (N)-gift: 110% in vergelijking tot middenvroegere rassen (indicatie 275 kg N inclusief de bodemvoorraad).
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kali: ca 200 kg voor het planten en een overbemesting van 250 kg na knolzetting bevordert de kwaliteit.
- Fosfaat volgens standaard advies.

## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- BELLINI heeft een normale kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Vermijd gronden met risico op Poederschurft.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	40.000	33	28
-35/55	38.000	35	29

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

### Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- BELLINI heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophthora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor Phytophthora in het loof.

### Loofdoding en oogst

- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.
- Oogst BELLINI voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

### Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Goede wondheling is essentieel omdat BELLINI vrij gevoelig is voor Fusarium.