


SH C 1001



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



- Zeer sterk ras
- Hoog drogestofgehalte
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge resistentie tegen Yn-virus
- Goede bewaarbaarheid



Morfologie

Rijptijd	60	Midden laat
Opbrengst rijp	105	Hoog
Grofheid	80	Grof
Knolvorm		Rond / Rond-ovaal
Knolaantal		15-17
Vleeskleur na koken		Geel
Schilkleur		Donker geel

Toleranties

Kiemrust	67	Gemiddeld
Sencor gevoeligheid	60	Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	76	Goed
Blauwgevoeligheid	24	Zeer gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof		24,2
OWG		451

Resistenties

Kringerigheid	99	Hoog resistent
Phytophthora loof	56	Weinig vatbaar
Schurft	55	Vatbaar
YN-virus	99	Hoog resistent
Yntn-virus knoltolerantie	99	Tolerant

Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8		1	
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 230 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.
- Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.

SH C 1001



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- SH C 1001 heeft een lange kiemrust.
- Voor SH C 1001 wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- SH C 1001 is geschikt voor alle grondsoorten.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Plant SH C 1001 3 cm dieper, voor een sterke ontwikkeling van het wortelgestel en mineralen opname.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-30/40	54.000	25	21
-40/50	42000	32	26
-50/60	32.000	42	35

-Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
-Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.



Teelt

- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- SH C 1001 is tamelijk resistent voor kringerigheid.

Loofdoding en oogst

- Oogst SH C 1001 voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

Bewaring