


Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Tubercules de gros calibres
- Variété très forte
- Très adaptée aux marchés primeurs
- S'adapte à de très nombreux environnements



Morphologie

Type de cuisson	AB - Très légèrement fari
Maturité	71 Demi-hâtive
Rendement à maturité	110 Haut
Grosueur du tubercule	86 Très gros
Forme	Oval
Nombre de tubercules	6-8
Chair après cuisson	Jaune clair
Couleur de peau	Jaune

Résistances

Virus rattle du tabac	Sensible
Mildiou du feuillage	Très sensible
Mildiou du tubercule	Sensible
Gale commune	Peu sensible
Gale poudreuse	Sensible
Virus Yn	Sensible
Yntn virus sur tubercule	Tolérants

Nématodes

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	1		
Galle Verruqueuse			
F1	F2	F6	F18
9		5	

Tolérances

Période de dormance	59 Moyenne
Levée	79 Vite
Sens. au Metribuzin	75 Peu sensible
Développement du feuilla	77 Bon
Noircissement interne	14 Assez sensible
Boulage	90 Pas de sensibilité
Matière sèche	19,2
Poids sous l'eau	349

Fertilisation

- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété précoce. (A titre indicatif: 275 kg N reliquats compris).
- Azote (N): env. 80% des quantités normalement apportées sur une variété précoce.
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Premier apport d'azote en couverture: immédiatement après l'initiation du tubercule.
- Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, une disponibilité trop tardive en Cl pouvant induire des taux de matière sèche trop basse.
- Fertilisation phosphorée selon analyse de sol
-
- Des apports de manganèse et le magnésium encourageront le développement d'un feuillage vigoureux et préviendront une sénescence prématurée.

EVEREST



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

Plantation

- Toujours traiter les plants de EVEREST et le sol contre le Rhizoctonia.
- La variété présente une légère sensibilité au boulage, éviter de planter dans un sol trop froid.
- Choisissez les types de sols qui ne sont pas sensibles à la gale commune.
- Eviter la condensation sur les plants pour éviter la contamination des maladies.
- Planter des plants au stade points blancs donne les meilleurs résultats.

Densité du peuplement

buttes	Distance entre les		
-28/35	55.000	24	20
-35/55	40.000	33	28

-Profondeur de plantation: Normal.
-Couper les plants de gros calibre n'est pas conseillé.



Culture

- Teneur en matière sèche élevée
- L'utilisation de la métribuzine est recommandé en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Un programme préventif anti-mildiou est recommandé
- Prévoyez un programme avec une efficacité anti-mildiou sur tubercules dans la deuxième partie de cycle

Défanage

- Attendre la sénescence naturelle, cela permettra d'atteindre des teneurs en matière sèche plus élevées.

La conservation

- EVEREST a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être utilisée pour les premiers mois suivant la récolte.
- Une bonne ventilation et cicatrisation sont essentielles après la récolte du fait que EVEREST est assez sensible à fusariose.