


# BRICATA KWS



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Zeer heldere schil
- Goede opbrengst
- Geschikt voor (thuis) frites
- Goede Resistentie tegen kringerheid



### Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	64 Midden laat
Opbrengst rijp	106 Hoog
Grofheid	79 Gemiddeld
Knolvorm	Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Geel
Schilkleur	Geel

### Toleranties

Kiemrust	66 Gemiddeld
Sencor gevoeligheid	55 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	79 Zeer goed
Blauwgevoeligheid	14 Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	21,0
OWG	386

### Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

### Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9	+7			+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10				

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Stikstof (N)-gift: 110% in vergelijking tot middenvroegere rassen (indicatie 275 kg N inclusief de bodemvoorraad).
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Organische mest helpt om een vitaal gewas te behouden.
- BRICATA KWS is gevoelig voor mineraaltekorten, daarom bemesten met sporenelementen.

## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- BRICATA KWS heeft een normale kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanise koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Voor BRICATA KWS wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- BRICATA KWS is geschikt voor alle grondsoorten.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	50.000	27	22
-35/45	42.000	32	26
-35/50	40.000	33	28
-45/55	38.000	35	29
-50/60 gesneden pootgoed 28	40.000		33

-Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.  
-Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

### Teelt

- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophthora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor Phytophthora in het loof.
- BRICATA KWS is gevoelig voor stengel Alternaria.

### Loofdoding en oogst

- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede schilkwaliteit te behouden.
- Oogst BRICATA KWS voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

### Bewaring

- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 6 °C.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschuif.
- Voor langdurige opslag moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingmiddelen.