

BRICATA KWS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Zeer heldere schil
- Goede opbrengst
- Geschikt voor (thuis) frites
- Goede Resistentie tegen kringerheid



Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	65 Midden vroeg
Opbrengst rijp	106 Hoog
Grofheid	79 Gemiddeld
Knolvorm	Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Geel
Schilkleur	Geel

Toleranties

Kiemrust	65 Gemiddeld
Sencor gevoeligheid	55 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	78 Goed
Blauwgevoeligheid	13 Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	21,0
OWG	386

Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Weinig vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	1		
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Stikstof (N)-gift: 110% in vergelijking tot middenvroeg rassen (indicatie 275 kg N inclusief de bodemvoorraad).
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Organische mest helpt om een vitaal gewas te behouden.
- BRICATA KWS is gevoelig voor mineraaltekorten, daarom bemesten met sporenelementen.

BRICATA KWS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- BRICATA KWS heeft een normale kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanise koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Voor BRICATA KWS wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- BRICATA KWS is geschikt voor alle grondsoorten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	50.000	27	22
-35/45	42.000	32	26
-35/50	40.000	33	28
-45/55	38.000	35	29
-50/60 cut seed	40.000	33	28

-Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.
-Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.



Teelt

- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophthora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor Phytophthora in het loof.
- BRICATA KWS is gevoelig voor stengel Alternaria.

Loofdoding en oogst

- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede schilkwaliteit te behouden.
- Oogst BRICATA KWS voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

Bewaring

- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 6 °C.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.
- Voor langdurige opslag moet gebruik worden gemaakt van kiemremmersmiddelen.