

AMARIN



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Zeer geschikt voor vroege teelt
- Vroeg met een vroege knolzetting
- Mooie heldere huid
- Hoge opbrengst



Morfologie

Kooktype	B - iets kruimig
Rijptijd	75 Midden vroeg
Opbrengst rijp	110 Hoog
Grofheid	82 Grof
Knolvorm	Rondovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Creme
Schilkleur	Geel

Toleranties

Kiemrust	62 Gemiddeld
Opkomst	75 Normaal
Sencor gevoeligheid	86 Niet gevoelig
Loofontwikkeling	70 Goed
Blauwgevoeligheid	8 Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	73 Weinig gevoelig
Droge stof	18,6
OWG	351

Resistenties

Kringerigheid	Vatbaar
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Resistent
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Vatbaar
YN-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	6		
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10	3	3	1

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 110% in vergelijking tot andere middenvroeg rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Hoge stikstofbehoefte, vooral tijdens beginontwikkeling.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Om vroeg te kunnen oogsten wordt organische mest afgeraden.
- Zorg voor een regelmatige beschikbaarheid van water en voedingsstoffen. Groeistagnatie gevolgd door snelle groei kan groeischeuren geven.

AMARIN



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- AMARIN heeft een goede kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Snijden van pootgoed wordt niet geadviseerd, vanwege gevoeligheid voor rotte knollen.
- Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschurft en andere bodemgebonden ziekten te beheersen. Azoxystrobine toegediend op de bodem zorgt voor goede resultaten op vele schimmels.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een hoog risico op kringerigheid. Gebruik Nematicides.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	55.000	24	20
-35/55	40.000	33	28

- Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.



Teelt

- AMARIN heeft een vlotte opkomst.
- AMARIN heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophthora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor Phytophthora in het loof.
- Kies voor middelen met een goede knolbescherming later in het seizoen.
- AMARIN is gevoelig voor stengel Alternaria.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.

Loofdoding en oogst

- AMARIN heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
-
- AMARIN is goed bestand tegen stootblauw, tenzij zich extreme omstandigheden voordoen.

Bewaring

- AMARIN is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- AMARIN heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.