

# SH C 909



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede opbrengst
- Hoog drogestofgehalte
- Goede bewaarbaarheid



### Morfologie

Rijptijd	53	Laat
Opbrengst rijp	104	Vrij hoog
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Rond / Rond-ovaal
Knolaantal		12-14
Vleeskleur na koken		Geel
Schilkleur		Donker geel

### Toleranties

Kiemrust	99	Zeer lang
Sencor gevoeligheid	65	Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	73	Goed
Blauwgevoeligheid	13	Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof		22,9
OWG		425

### Resistenties

Kringerigheid	99	Hoog resistent
Phytophthora loof	60	Weinig vatbaar
Schurft	55	Vatbaar
Poederschurft	70	Resistent
YN-virus	55	Vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	99	Tolerant

### Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8			
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- N-gift: 160kg/ha inclusief bodemvoorraad.
- Kali: ca 250 kg voor het poten. Bij Kali arme gronden nog een overbemesting van 150 kg na de knolzetting toedienen.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

# SH C 909



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- SH C 909 heeft een lange kiemrust.
- Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
- Voor SH C 909 wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.
- Voorkiemen is niet nodig, SH C 909 kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- Op Rhizoctonia gevoelige gronden, wordt een grondbehandeling geadviseerd.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-30/40	60.000	22	19
-40/50	44000	30	25
-50/60	36.000	37	31

-Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.



### Teelt

- SH C 909 heeft een trage opkomst, later zal het loof zich ontwikkelen tot een sterk gewas.
- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- SH C 909 is gevoelig voor gewone schurft.
- SH C 909 is vatbaar voor het Yntn-virus, gebruik daarom een sterke bladluisbestrijdingsmiddel.
- SH C 909 heeft een goede droogteresistentie.

### Loofdoding en oogst

- SH C 909 is gemiddeld gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.

### Bewaring

- SH C 909 heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 7°C.