


Consejos generales para la producción de consumo

- Alto número de tubérculos
- Calibre y forma del tubérculo uniforme
- Alta producción
- Buena tolerancia a condiciones de sequía



Morfología

Tipo de cocion	BC - Harinosa
Maduración	62 Semi- tardía
Producción	114 Alta
Tamaño del tuberculo	80 Calibre grande
Forma	Oval-alargada
Número de tubérculos	12-14
Color carne cocinar	Amarilla clara
Color de piel	Amarilla

Tolerancias

Período de dormencia	64 Medio
Emergencia	74 Normal
Sens. Metribuzin	85 Algo sensible
Desarrollo de la planta	76 Bueno
Golpeo interno	17 Bastante sensible
Fenómeno patatitas	90 No sensible
Materia seca	21,1
Peso bajo agua	389

Resistencias

Spraing	Buena resistencia
Mildiú en planta	Sensible
Mildiú en el tubérculo	Sensible
Sarna común	Sensible
Sarna verrugosa	Sensible
Virus Yn	Sensible
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante

Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
8	+3		
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet

Fertilización

- Nitrógeno (N): aproximadamente 110% en comparación a variedades medio-tempranas (como indicación 275 kg. N incluyendo las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Potasio (K): aprox. 200kg. K./ha antes de plantar y 250kg. K/ha después de la tuberización mejorará la calidad.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.

Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- BELLINI tiene una dormencia media
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidratación
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales
- Evitar suelos con riesgo alto de sarna verrugosa.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	40.000	33	28
-35/55	38.000	35	29
-Profundidad de plantación: Normal.			

Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- BELLINI Tiene una buena tolerancia a la metribuzina
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad a Phytophthora en la planta.

Destrucción de las plantas

- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.
- Cosechar BELLINI con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento

- BELLINI tiene buen almacenamiento, también para períodos largos.
- Es esencial una buena curación ya que BELLINI es ligeramente susceptible a Fusarium.