

# DONALD



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Geschikt voor meerdere marktsegmenten
- Goed resistentiepakket
- Goede Resistentie tegen kringerheid
- Am- resistentie tegen Ro1 & Ro2/3



### Morfologie

Kooktype	BC - Kruidig
Rijptijd	71 Midden vroeg
Opbrengst rijp	93 Goed
Grofheid	76 Gemiddeld
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Geel
Schilkleur	Geel

### Toleranties

Kiemrust	64 Gemiddeld
Opkomst	80 Vlot
Sencor gevoeligheid	85 Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	74 Goed
Blauwgevoeligheid	18 Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	24,7
OWG	462

### Resistenties

Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Vatbaar
Schurft	Vatbaar
Poederschurft	Zeer vatbaar
YN-virus	Weinig vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Zeer gevoelig

### Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9	+9		+5	+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10	7	7		

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 220 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- N-gift: 250 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Stikstof in 1 keer toedienen voor een vroege beginontwikkeling.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Op lichtere gronden wordt een extra borium gift geadviseerd.

# DONALD



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- DONALD heeft een normale kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Voor DONALD wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- DONALD is geschikt voor alle grondsoorten.
- Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
- Vermijd gronden die gevoelig zijn voor Poederschurft.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	55.000	24	20
-35/45	42.000	32	26
-35/55	38.000	35	29
-45/55	36.000	37	31

-Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

### Teelt

- DONALD groeit hoog in de rug.
- DONALD heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- DONALD is tamelijk resistent voor kringerigheid.

### Loofdoding en oogst

- DONALD is gevoelig voor stootblauw en rooibeschatiging.
- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.

### Bewaring

- DONALD is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 6 °C.
- Een bewaartemperatuur die lager is dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers.