

CERATA KWS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Grove knollen
- Lage stikstofbehoefte
- Goede blauw tolerantie
- Sterk loof
- Geschikt voor (thuis) frites
- Goede resistentie tegen Schurft



Morfologie

Kooktype	B - iets kruimig
Rijptijd	54 Laat
Opbrengst rijp	110 Hoog
Grofheid	81 Grof
Knolvorm	Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Creme
Schilkleur	Rood

Toleranties

Kiemrust	73 Lang
Sencor gevoeligheid	65 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	80 Zeer goed
Blauwgevoeligheid	3 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	20,7
OWG	380

Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent		
Schurft	Resistent		
YN-virus	Vatbaar		
Aardappelmoetheid			
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9			
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 250 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- N-gift: 100% in vergelijking tot andere middenlate rassen (indicatie: 250 kg N inclusief de bodemvoorraad).
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

CERATA KWS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Snijden verhoogt het risico op infecties. Ontsmet het mes en gebruik krijtpoeder. Zorg voor een snelle droging voor een snel herstel..
- Voor CERATA KWS wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- CERATA KWS is geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	50.000	27	22
-35/50	84.000	16	13
-35/55	38.000	35	29

- Pootdiepte iets boven maaiveld, groeit diep in de rug.
- Plantaantal heeft een sterke invloed op de grofheid.



Teelt

- De opkomst is laat maar het loof ontwikkelt sterk in een later stadium.
- Matige ontwikkeling.
- Goed dekkend, hoog opgaand gewas.
- CERATA KWS heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- CERATA KWS is gevoelig voor Y-virus.
- Extra aandacht voor luisbestrijding.
- Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.

Loofdoding en oogst

Bewaring

- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.