

# CAMEL



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Geschikt voor verschillende marktsegmenten
- Hoge opbrengst
- Heldere donkerrode schil
- Am- resistentie tegen Pa2 & Pa3



### Morfologie

Kooktype	A - Vastkokend
Rijptijd	66 Midden vroeg
Opbrengst rijp	111 Hoog
Grofheid	84 Grof
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Donkergeel
Schilkleur	Rood

### Toleranties

Kiemrust	66 Gemiddeld
Opkomst	65 Traag
Sencor gevoeligheid	50 Gevoelig
Loofontwikkeling	76 Goed
Blauwgevoeligheid	13 Vrij gevoelig
Onderzeeërvorming	90 Niet gevoelig
Droge stof	18,1
OWG	327

### Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Hoog resistent
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

### Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	1	7	8
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
6			

### Bemesting

- N-gift: 200 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- N-gift: 80% in vergelijking tot andere middenlate rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

# CAMEL



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- CAMEL heeft een lange kiemrust.
- Voorkom condensatie om versmering te voorkomen.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- Knol- en/of bodembehandelingen worden geadviseerd om Rhizoctonia, zilverschurft en andere bodemgebonden ziekten te beheersen. Azoxystrobine toegediend op de bodem zorgt voor goede resultaten op vele schimmels.
- CAMEL is geschikt voor alle grondsoorten.
- Vermijd gronden die gevoelig zijn voor gewone schurft.
- Plant potgoed dat vrij is van condens om versmering te voorkomen.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	50.000	27	22
-35/55	40.000	33	28

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.



### Teelt

- CAMEL heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria Solani en Alternaria Alternata.
- Start vroegtijdig en regelmatig met Phytophthora bespuiting, vanwege de gevoeligheid voor Phytophthora in het loof.
- In geval van risico op gewone schurft, heeft beregenen tijdens knolzetting de voorkeur.

### Loofdoding en oogst

- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- Houd minstens 3 weken tussen loofdoding en oogst, voor een betere huidvastheid.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.

### Bewaring

- CAMEL heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.