

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Grove knollen
- Zeer heldere schil
- Hoog drogestofgehalte



Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	60 Midden laat
Opbrengst rijp	115 Zeer hoog
Grofheid	86 Zeer grof
Knolvorm	Rondovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel

Toleranties

Kiemrust	66 Gemiddeld
Sencor gevoeligheid	67 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	72 Goed
Blauwgevoeligheid	5 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	66 Weinig gevoelig
Droge stof	20,4
OWG	374

Resistenties

Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Vatbaar
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	3	1	

Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10	7	2	1

Bemesting

- N-gift: 200 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- TYSON heeft een korte kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- TYSON is geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	55.000	24	20
-35/55	40.000	33	28
-50/60	34.000	39	33

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.



Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- TYSON heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)

Loofdoding en oogst

- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.

Bewaring

- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.