


## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Grove knollen
- Zeer heldere schil
- Hoog drogestofgehalte



### Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	59 Midden laat
Opbrengst rijp	114 Hoog
Grofheid	86 Zeer grof
Knolvorm	Rondovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel

### Toleranties

Kiemrust	65 Gemiddeld
Sencor gevoeligheid	67 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	72 Goed
Blauwgevoeligheid	4 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	66 Weinig gevoelig
Droge stof	20,4
OWG	373

### Resistenties

Kringerigheid	Resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Weinig vatbaar
YN-virus	Zeer vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

### Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9	+3	1		+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10	+7	+2	+1	

### Bemesting

- N-gift: 200 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- TYSON heeft een korte kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- TYSON is geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	55.000	24	20
-35/55	40.000	33	28
-50/60	34.000	39	33

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

### Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- TYSON heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)

### Loofdoding en oogst

- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.

### Bewaring

- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.