

# SH C 1010



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoog knolaantal
- Hoge opbrengst
- Hoog drogestofgehalte
- Goede Resistentie tegen kringerheid



### Morfologie

Rijptijd	63	Midden laat
Opbrengst rijp	94	Goed
Grofheid	79	Gemiddeld
Knolvorm		Rond / Rond-ovaal
Knolaantal		15-17
Vleeskleur na koken		Geel
Schilkleur		Donker geel

### Toleranties

Kiemrust	94	Zeer lang
Sencor gevoeligheid	60	Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	77	Goed
Blauwgevoeligheid	26	Zeer gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof		24,3
OWG		453

### Resistenties

Kringerigheid	99	Hoog resistent
Phytophthora loof	58	Weinig vatbaar
Phytophthora knol	23	Zeer vatbaar
Schurft	65	Weinig vatbaar
Poederschurft	68	Weinig vatbaar
YN-virus	43	Weinig vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	99	Tolerant

### Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
8				+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10				

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 230 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.
- Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.

# SH C 1010



## Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

### Voorbehandeling en poten

- SH C 1010 heeft een lange kiemrust.
- Voor SH C 1010 wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- SH C 1010 is geschikt voor alle grondsoorten.
- Plant SH C 1010 3 cm dieper, voor een sterke ontwikkeling van het wortelgestel en mineralen opname.
- Planten in het witte puntjes stadium geeft de beste resultaten.

### Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-30/40	52.000	26	21
-40/50	40000	33	28
-50/60	34.000	39	33

-Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.  
-Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

### Teelt

- Het gebruik van Metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Indien na-opkomst toepassing; gebruik het lage dosering systeem.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- SH C 1010 is tamelijk resistent voor kringrigheid.
- Beregening wordt geadviseerd onder droge omstandigheden.

### Loofdoding en oogst

- Oogst SH C 1010 voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

### Bewaring

- SH C 1010 heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8°C.