


Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Variété polyvalente
- Bon profil agronomique
- Hautement résistant aux symptômes de nécrose annulaire (TRV)
- Résistance à nématode à kyste de la pomme de terre Ro1 & Ro2/3



Morphologie

Type de cuisson	BC - Farineuse
Maturité	71 Demi-hâtive
Rendement à maturité	93 Bien
Grosseur du tubercule	76 Moyenne
Forme	Oval
Nombre de tubercules	12-14
Chair après cuisson	Jaune
Couleur de peau	Jaune

Résistances

Virus rattle du tabac	Résistant
Mildiou du feuillage	Sensible
Mildiou du tubercule	Sensible
Gale commune	Sensible
Gale poudreuse	Très sensible
Virus Yn	Peu sensible
Yntn virus sur tubercule	Très sensible

Nématodes

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+9		+5
Galle Verruqueuse			
F1	F2	F6	F18
10	7	7	

+ Non testées par un Organisme officiel / Données internes Stet

Tolérances

Période de dormance	64 Moyenne
Levée	80 Vite
Sens. au Metribuzin	85 Peu sensible
Développement du feuilla	74 Bon
Noircissement interne	18 Assez sensible
Boulage	90 Pas de sensibilité
Matière sèche	24,7
Poids sous l'eau	462

Fertilisation

- Adapter la fertilisation après l'analyse du sol
- Azote: approx. 220U/ha, fournitures du sol incluses.
- Azote (N): env. 250 kg N / ha reliquats inclus.
- L'azote peut être apporté en une seule fois, ceci aidant à avoir une culture plus précoce.
- Un apport de Chlorure de potasse permet de réduire la sensibilité aux coups bleus
- Sur les sols les plus légers, un apport supplémentaire de bore est recommandé.

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

Plantation

- DONALD a une dormance moyenne.
- Réchauffer les plants à une température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de DONALD et le sol contre le Rhizoctonia.
- DONALD peut être cultivée tous types de sols.
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur les sols les plus légers.
- Choisissez les types de sols qui ne sont pas sensibles à la gale poudreuse.

Densité du peuplement

buttes	Distance entre les		
-28/35	55.000	24	20
-35/45	42.000	32	26
-35/55	38.000	35	29
-45/55	36.000	37	31

- Profondeur de plantation: 3 cm de plus que la normale.

Culture

- DONALD tubérise dans le haut de la butte.
- DONALD a une bonne tolérance à metribuzin (Sencor).
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité élevée sur feuillage et sur tubercules.
- DONALD n'est pas sensible à la nécrose annulaire.

Défanage

- DONALD est sensible aux coups bleus et et dommages mécaniques.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte
- Évitez les endommagements post-récoltes pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.

La conservation

- DONALD est une variété précoce. En conséquence, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Stocker à une température de 6°C.
- Un stockage à une température inférieure à celle recommandée entraînera une augmentation du sucrage des pommes de terre.