


BRICATA KWS



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Belle présentation de peau
- Bon potentiel de rendement
- Qualité des frites ménagères à longue conservation



Morphologie

Type de cuisson	AB - Très légèrement fari
Maturité	65 Demi-hâtive
Rendement à maturité	106 Haut
Grosseur du tubercule	79 Moyenne
Forme	Ovale / Long-ovale
Nombre de tubercules	12-14
Chair après cuisson	Jaune
Couleur de peau	Jaune

Tolérances

Période de dormance	67 Moyenne
Sens. au Metribuzin	55 Assez sensible
Développement du feuillage	79 Très bon
Noircissement interne	14 Peu sensible
Boulage	90 Pas de sensibilité
Matière sèche	20,9
Poids sous l'eau	384

Résistances

Virus rattle du tabac	Bonne résistance
Mildiou du feuillage	Peu sensible
Mildiou du tubercule	Peu sensible
Gale commune	Sensible
Gale poudreuse	Peu sensible
Virus Yn	Sensible
Yntn virus sur tubercule	Tolérants

Nématodes

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+7		
F1	F2	F6	F18
10			

+ Non testées par un
Organisme officiel /
Données internes Stet

Fertilisation

- Adapter la fertilisation après l'analyse du sol
- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété précoce. (A titre indicatif: 275 kg N reliquats compris).
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Premier apport d'azote en couverture: immédiatement après l'initiation du tubercule.
- Fertilisation phosphorée selon analyse de sol
- Un apport de Chlorure de potasse permet de réduire la sensibilité aux coups bleus
- La fumure organique aidera à maintenir une culture vigoureuse.
- BRICATA KWS Est sensible aux carences minérales, donc fertilisez avec des oligo-éléments.

BRICATA KWS



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

Plantation

- BRICATA KWS a une dormance moyenne.
- Réchauffer les plants à un température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de BRICATA KWS et le sol contre le Rhizoctonia.
- BRICATA KWS peut être cultivée tous types de sols.

Densité du peuplement

	Distance entre les		
buttes			
-28/35	50.000	27	22
-35/45	42.000	32	26
-35/50	40.000	33	28
-45/55	38.000	35	29
-50/60 plants coupés	40.000	33	28

- Profondeur de plantation: Normal.
- Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Culture

- L'utilisation de la métribuzine est recommandé en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité sur feuillage.
- BRICATA KWS est parfois sensible à Alternaria de tiges

Défanage

- Afin de préserver la lavabilité, les tubercules doivent être récoltés rapidement après défanage.
- Récolter avec soin, lorsque les taux de matière sèche sont élevés, BRICATA KWS peut être sensible aux coups bleus.

La conservation

- Faites attention à une bonne cicatrisation de la peau.
- Stocker à une température de 6°C.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.
- Pour un stockage long, l'emploi d'inhibiteurs de germination est obligatoire.