

LEVINATA KWS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



- Hoog drogestofgehalte
- Hoge opbrengst
- Vroege afrijping
- Goede resistentie tegen Schurft
- Goede bewaarbaarheid



Morfologie

Rijptijd	73	Midden vroeg
Opbrengst rijp	93	Goed
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Rond / Rond-ovaal
Knolaantal	12-14	
Vleeskleur na koken		Geel
Schilkleur		Geel

Toleranties

Kiemrust	95	Zeer lang
Sencor gevoeligheid	35	Gevoelig
Loofontwikkeling	73	Goed
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	90	Niet gevoelig
Droge stof	22,5	
OWG	416	

Resistenties

Kringerigheid	99	Hoog resistent
Phytophthora loof	43	Vatbaar
Schurft	65	Weinig vatbaar
YN-virus	55	Vatbaar
Yntn-virus knoltolerantie	99	Tolerant

Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	8	3	
Wratziekte			
F1	F2	F6	F18
10			

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 250 kg N/ha inclusief de bodemvoorraad.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kali: ca 200 kg voor het poten en een overbemesting van 250 kg na knolzetting bevordert de kwaliteit.
- Mangaan en magnesium zorgen voor een vitaal gewas en voorkomen vroegtijdige afrijping.

LEVINATA KWS



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- LEVINATA KWS heeft een lange kiemrust.
- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- Indien een topspruit aanwezig, verwijder deze en plant in het witte puntjes stadium.
- LEVINATA KWS is geschikt voor alle grondsoorten.
- Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervoegen.
- Op Rhizoctonia gevoelige gronden, wordt een grondbehandeling geadviseerd.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-30/40	56.000	24	20
-40/50	44.000	30	25
-50/60	38.000	35	29

- Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.



Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- LEVINATA KWS is gevoelig voor Metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- LEVINATA KWS is tamelijk resistent voor kringerigheid.
- LEVINATA KWS heeft een goede droogteresistentie.

Loofdoding en oogst

- LEVINATA KWS groeit in de hele rug. Let hierop met rooien.
- Oogst LEVINATA KWS voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.

Bewaring

- LEVINATA KWS heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 7°C.
- LEVINATA KWS heeft een lange kiemrust. Kiemremmers zijn alleen nodig voor late leveringen.