

# SAFARI



## Consejos generales para la producción de consumo

- Tubérculos grandes
- Alta producción
- Muy buen sabor
- Buena calidad para cocción



### Morfología

Tipo de cocción	B - Ligeramente harinosa
Maduración	51 Tardia
Producción	114 Alta
Tamaño del tuberculo	84 Calibre grande
Forma	Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos	9-11
Color carne cocinar	Amarilla clara
Color de piel	Amarilla

### Tolerancias

Período de dormencia	73 Largo
Emergencia	61 Lenta
Sens. Metribuzin	60 Bastante sensible
Desarrollo de la planta	74 Bueno
Golpeo interno	7 No sensible
Fenómeno patatitas	75 Algo sensible
Materia seca	19,8
Peso bajo agua	362

### Resistencias

Spraing	Resistente
Mildiú en planta	Sensible
Mildiú en el tubérculo	Poco sensible
Sarna común	Sensible
Sarna verrugosa	Sensible
Virus Yn	Sensible
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante

#### Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	+5		
Roña			
F1	F2	F6	F18

+ No probado por un Organismo oficial / Datos internos de Stet

### Fertilización

- Nitrógeno: Aprox. 175kg. N/ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.
- SAFARI es susceptible a deficiencias minerales, por lo tanto fertilizar con micro-elementos

# SAFARI



## Consejos generales para la producción de consumo

### Cultivo

- SAFARI tiene una dormencia larga
- Un tratamiento con calor es preferible para romper la dormencia
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Tratar siempre la semilla de SAFARI y el suelo contra Rhizoctonia
- El terreno debería tener un buen drenaje con buena estructura.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- No plantar en terrenos fríos ya que hay riesgo de emergencia irregular

### Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	55.000	24	20
-35/55	46.000	29	24
-Profundidad de plantación: Normal.			

### Período de cultivo

- La emergencia es algo lenta, más tarde la planta se desarrolla bien.
- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.

### Destrucción de las plantas

- Utilizar productos químicos con fuerte efecto en los tallos para facilitar el desprendimiento de los tubérculos
- Asegurar una maduración natural del cultivo y que los tubérculos hagan suficientemente la piel.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- Los tubérculos tienen calibre grande. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.

### Almacenamiento

- SAFARI tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento