

SAFARI



Consejos generales para la producción de consumo

- Tubérculos grandes
- Alta producción
- Muy buen sabor
- Buena calidad para cocción



Morfología

Tipo de cocción	B - Ligeramente harinosa
Maduración	51 Tardía
Producción	115 Muy alta
Tamaño del tubérculo	85 Calibre grande
Forma	Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos	9-11
Color carne cocinar	Amarilla clara
Color de piel	Amarilla

Tolerancias

Período de dormencia	74 Largo
Emergencia	61 Lenta
Sens. Metribuzin	60 Bastante sensible
Desarrollo de la planta	75 Bueno
Golpeo interno	7 Algo sensible
Fenómeno patatitas	75 Algo sensible
Materia seca	19,8
Onderwatergewicht	362

Resistencias

Spraing	Resistente		
Mildiú en planta	Poco sensible		
Mildiú en el tubérculo	Sensible		
Sarna común	Sensible		
Sarna verrugosa	Sensible		
Virus Yn	Muy sensible		
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante		
Res. a nemátodos			
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	5		
Roña			
F1	F2	F6	F18

Fertilización

- Nitrógeno: Aprox. 175kg. N/ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.
- SAFARI es susceptible a deficiencias minerales, por lo tanto fertilizar con micro-elementos

SAFARI



Consejos generales para la producción de consumo

Cultivo

- SAFARI tiene una dormencia larga
- Un tratamiento con calor es preferible para romper la dormencia
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Tratar siempre la semilla de SAFARI y el suelo contra Rhizoctonia
- El terreno debería tener un buen drenaje con buena estructura.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- No plantar en terrenos fríos ya que hay riesgo de emergencia irregular

Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	55.000	24	20
-35/55	46.000	29	24
-Profundidad de plantación: Normal.			



Período de cultivo

- La emergencia es algo lenta, más tarde la planta se desarrolla bien.
- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.

Destrucción de las plantas

- Utilizar productos químicos con fuerte efecto en los tallos para facilitar el desprendimiento de los tubérculos
- Asegurar una maduración natural del cultivo y que los tubérculos hagan suficientemente la piel.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- Los tubérculos tienen calibre grande. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.

Almacenamiento

- SAFARI tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento