


## Algemeen Teeltadvies Pootgoedteelt

- Geschikt voor verschillende marktsegmenten
- Goede bewaring
- Geschikt voor meerdere marktsegmenten
- Hoge resistentie tegen Yn-virus



### Morfologie

|                     |      |             |
|---------------------|------|-------------|
| Rijptijd            | 56   | Midden laat |
| Grofheid            | 85   | Grof        |
| Knolaantal          | 9-11 |             |
| Vleeskleur na koken |      | Donkergeel  |
| Schilkleur          |      | Donker geel |
| Bloemkleur          | 1    | Wit         |

### Toleranties

|                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| Kiemrust            | 84   | Zeer lang       |
| Opkomst             | 77   | Vlot            |
| Sencor gevoeligheid | 35   | Gevoelig        |
| Loofontwikkeling    | 78   | Goed            |
| Blauwgevoeligheid   | 12   | Weinig gevoelig |
| Onderzeeërvorming   | 70   | Weinig gevoelig |
| Droge stof          | 20,9 |                 |
| OWG                 | 385  |                 |

### Resistenties

|                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Kringerigheid             | 96 | Hoog resistent |
| Phytophthora loof         | 44 | Vatbaar        |
| Phytophthora knol         | 78 | Resistent      |
| Poederschurft             | 43 | Zeer vatbaar   |
| YN-virus                  | 79 | Weinig vatbaar |
| YNTN-virus zichtbaarheid  | 68 | Zichtbaar      |
| Yntn-virus knoltolerantie | 97 | Tolerant       |

### Aardappelmoeheid

| Ro1        | Ro2/3 | Pa2 | Pa3 |   |
|------------|-------|-----|-----|---|
| 9          | +1    | 2   | 2   | + Geen officiële meting / Stet eigen meting |
| Wratziekte |       |     |     |   |
| F1         | F2    | F6  | F18 |   |
| 9          | 7     | 7   |     |   |

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 80% in vergelijking tot andere middenlate rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Een goede fosfaat en kali bemesting kan resulteren in een hogere opbrengst.

## Algemeen Teeltadvies Pootgoedteelt

### Voorbehandeling en poten

- AGRIA heeft een lange kiemrust.
- Behandeling met Talent heeft een positief effect op het knolaantal.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone Schurft.

### Plantafstanden

| Maat   | Plantafstand/ha | Rijafstand |       |
|--------|-----------------|------------|-------|
|        |                 | 75 cm      | 90 cm |
| -28/35 | 100.000         | 13         | 11    |
| -35/50 | 84.000          | 16         | 13    |
| -35/55 | 74.000          | 18         | 15    |
| -50/60 | 66.000          | 20         | 17    |

-Plantdiepte: normaal, maaivelddiepte.

### Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Vrij gevoelig voor Metribuzin (Sencor), kan alleen voor opkomst gespoten worden.

### Loofdoding en oogst

- Wees alert, knollen groeien snel uit de maat.
- AGRIA is gevoelig voor Phoma.
- Gevoelig voor rooibeschatiging en bacterieziekten.

### Bewaring

- AGRIA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Extra aandacht voor wondheling, ook na het sorteren.
- De knollen zijn lang. Denk om valhoogtes bij afleveren in verband met kans op beschadiging.