

TRIPLO



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Qualités de frites ménagères
- Variété polyvalente
-



Morphologie

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de cuisson | B - Légèrement farineuse |
| Maturité | 70 Demi-hâtive |
| Rendement à maturité | 104 Assez élevé |
| Grosseur du tubercule | 83 Gros |
| Forme | Rond-ovale / Ovale |
| Nombre de tubercules | 9-11 |
| Chair après cuisson | Jaune clair |
| Couleur de peau | Jaune |
| Fruits | Peu des fruits |

Tolérances

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Période de dormance | 54 Assez courte |
| Levée | 80 Vite |
| Sens. au Metribuzin | 51 Sensible |
| Développement du feuillage | 75 Bon |
| Noircissement interne | 8 Peu sensible |
| Boulage | 80 Pas de sensibilité |
| Matière sèche | 20,2 |
| Poids sous l'eau | 385 |

Résistances

| | |
|--------------------------|---------------|
| Virus rattle du tabac | Peu sensible |
| Mildiou du feuillage | Peu sensible |
| Mildiou du tubercule | Résistant |
| Gale commune | Sensible |
| Gale poudreuse | Très sensible |
| Virus Yn | Peu sensible |
| Yntn virus sur tubercule | Peu sensible |

Nématodes

| | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|
| Ro1 | Ro2/3 | Pa2 | Pa3 |
| 9 | 3 | | |
| Galle Verruqueuse | | | |
| F1 | F2 | F6 | F18 |
| 10 | 3 | 3 | 3 |

Fertilisation

- Azote (N): env. 200 kg N / ha reliquats inclus.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

TRIPLO



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

Plantation

- TRIPLO a une dormance courte.
- Si un germe apical est présent, retirez-le et planter des plants au stade points blancs.
-
- Évitez les sols à forts risques de galles commune
- Planter les plants de gros calibre plus profondément pour éviter les tubercules verdis.
- Ne pas planter dans des sols trop froids ce qui entrainerait un risque d'émergence trop irrégulière.

Densité du peuplement

| buttes | Distance entre les | | |
|--------|--------------------|----|----|
| | | | |
| -28/35 | 60.000 | 22 | 19 |
| -35/50 | 50.000 | 27 | 22 |
| -35/55 | 48.000 | 28 | 23 |
| -50/60 | 34.000 | 39 | 33 |

- Profondeur de plantation: 3 cm de plus que la normale.



Culture

-
- Assez sensible à la Métribuzine, traitez uniquement en pré-levée
- Sur parcelles présentant un risque de gale commune, pensez à irriguer les cultures au moment de la tubérisation.

Défanage

- TRIPLO a une maturité précoce, le défanage doit se faire aisément.

La conservation

-
- TRIPLO est sensible au Fusarium.