

# BRICATA KWS



## Consejos generales para la producción de consumo

- Piel muy atractiva
- Alto rendimiento
- Apropia para hacer patatas fritas caseras
- Alta resistencia a spraing



### Morfología

Tipo de cocion	AB - Ligeramente firme
Maduración	65 Semi-temprana
Producción	106 Alta
Tamaño del tuberculo	79 Medio
Forma	Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos	12-14
Color carne cocinar	Amarilla
Color de piel	Amarilla

### Tolerancias

Período de dormencia	65 Medio
Sens. Metribuzin	55 Bastante sensible
Desarrollo de la planta	78 Bueno
Golpeo interno	13 Bastante sensible
Fenómeno patatitas	90 No sensible
Materia seca	21,0
Onderwatergewicht	386

### Resistencias

Spraing	Buena resistencia
Mildiú en planta	Poco sensible
Sarna común	Sensible
Sarna verrugosa	Poco sensible
Virus Yn	Sensible
Tol. Yntn tubérculo	Tolerante

Res. a nemátodos			
Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	1		
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

### Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 110% en comparación a variedades medio-tempranas (como indicación 275 kg. N incluyendo las reservas del suelo).
- Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
- Primera aplicación en cobertera (de Nitrógeno) directamente después del inicio de la tuberización.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.
- 
- El abonado orgánico ayudará mantener el vigor del cultivo
- BRICATA KWS es susceptible a deficiencias minerales, por lo tanto fertilizar con micro-elementos

# BRICATA KWS



## Consejos generales para la producción de consumo

### Cultivo

- BRICATA KWS tiene una dormencia media
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidratación
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales
- Tratar siempre la semilla de BRICATA KWS y el suelo contra Rhizoctonia
- BRICATA KWS puede ser cultivada en todo tipo de suelos

### Densidad de plantación

	Distancia entre		
caballones			
-28/35	50.000	27	22
-35/45	42.000	32	26
-35/50	40.000	33	28
-45/55	38.000	35	29
-50/60 cut seed	40.000	33	28
-Profundidad de plantación: Normal.			
-Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.			



### Período de cultivo

- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad a Phytophthora en la planta.
- 

### Destrucción de las plantas

- Para mantener una piel brillante y suave, no se debe dejar los tubérculos demasiado tiempo en el suelo después de la destrucción de la planta.
- Cosechar BRICATA KWS con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

### Almacenamiento

- 
- Almacenar a una temperatura estable de 6°C
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un riesgo alto a la Sarna Plateada.
- Para almacenamientos largos se necesita utilizar inhibidores de brotación.