

## Consejos generales para la producción de semilla



- Alta resistencia a nematodos del quiste Pa2 y Pa3 PCN
- Buen almacenamiento



### Morfología

Maduración	60	Semi- tardia
Tamaño del tuberculo	85	Calibre grande
Número de tubérculos	9-11	
Color carne cocinar		Amarilla clara
Color de piel		Amarilla
Color de la flor	1	Blanca

### Tolerancias

Período de dormencia	59	Medio
Emergencia	70	Normal
Desarrollo de la planta	80	Muy bueno
Golpeo interno	16	Sensible
Materia seca	20,0	
Onderwatergewicht	365	

### Resistencias

Spraing	78	Resistente
Mildiú en planta	46	Sensible
Sarna común	54	Sensible
Sarna verrugosa	50	Sensible
Virus Yn	20	Muy sensible
Tol. Yntn tubérculo	99	Tolerante

### Res. a nemátodos

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3
9	2	8	9
Roña			
F1	F2	F6	F18
10			

### Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- 
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.

## Consejos generales para la producción de semilla

### Cultivo

- EUROSTAR tiene una buena dormencia
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- EUROSTAR puede ser cultivada en todo tipo de suelos

### Densidad de plantación

caballones	Distancia entre		
-28/35	110.000	12	10
-35/50	82.000	16	14
-35/55	74.000	18	15

-Profundidad de plantación: Normal.



### Período de cultivo

- 
- La variedad es muy sensible a Metribuzin (Sencor), usarlo solo en pre-emergencia.

### Destrucción de las plantas

### Almacenamiento