

Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Goede kookkwaliteit
- Hoge opbrengst
- Geschikt voor (thuis) frites
- Hoge resistentie tegen Yn-virus

Morfologie

Kooktype	AB - Vrij vastkokend
Rijptijd	65 Midden vroeg
Opbrengst rijp	120 Zeer hoog
Grofheid	83 Grof
Knolvorm	Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal	12-14
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel

Toleranties

Kiemrust	53 Vrij kort
Sencor gevoeligheid	68 Vrij gevoelig
Loofontwikkeling	75 Goed
Blauwgevoeligheid	6 Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	65 Weinig gevoelig
Droge stof	19,7
OWG	360

Resistenties

Kringerigheid	Hoog resistent
Phytophthora loof	Vatbaar
Phytophthora knol	Weinig vatbaar
Schurft	Weinig vatbaar
Poederschurft	Vatbaar
YN-virus	Hoog resistent
Yntn-virus knoltolerantie	Tolerant

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2/3	Pa2	Pa3	
9				+ Geen officiële meting / Stet eigen meting
Wratziekte				
F1	F2	F6	F18	
10				

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 100% in vergelijking tot andere middenvroege rassen.
- De eerste overbemesting van stikstof direct na de knolzetting toedienen.
- Kalium- en Fosfaatbemesting volgens standaard advies.

AISHA



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

Voorbehandeling en poten

- AISHA heeft een korte kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om physiologische ouderdom te voorkomen.
- Voor AISHA wordt geadviseerd om altijd pootgoed en de bodem tegen Rhizoctonia te behandelen.
- Vermijd gronden met een hoog risico op Poederschurft.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.

Plantafstanden

Maat	Plantafstand/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
-28/35	50.000	27	22
-35/55	38.000	35	29

- Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.
- Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Teelt

- Opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- AISHA heeft een goede tolerantie tegen Metribuzin (Sencor)
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.

Loofdoding en oogst

- Streef naar een Onderwatergewicht van 365 gram.
- Voor een optimale kiemrust moet loofdoding plaatsvinden bij een afgerijpt gewas.
- Bij groenrooi of kort na loofdoding, zorg voor snelle droging en koeling voor behoud van schilkwaliteit.
- De dunne schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- AISHA is goed bestand tegen stootblauw, tenzij zich extreme omstandigheden voordoen.

Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Voor opslag langer dan 5 maanden is mechanische koeling vereist.